

Transforaminal Epidural Lumbar la Inyección de Esteroides

(Transforaminal)



1850 E. Washington St.
Colton, CA 92324

P: (909) 887-2991 / F: (909) 887-5694
i n l a n d p a i n m e d i c i n e . c o m

Transforaminal Epidural Lumbar, la Inyección de Esteroides se lleva a cabo para eliminar el dolor en la parte inferior de la espalda, así como el dolor que irradia por la pierna. Medicación con esteroides reduce el hinchazón y la inflamación, causada por estrechamiento del canal espinal, radiculopatía, la ciática y protrusión del disco vertebral. En algunos casos es necesario repetir el procedimiento hasta tres veces para obtener un máximo efecto de la medicación, sin embargo, la mayoría de los pacientes obtener un sustancial alivio del dolor después de una o dos inyecciones.

Manejo Del Dolor - Transforaminal Epidural Lumbar, la Inyección de Esteroides

Durante Transforaminal Epidural Lumbar, la Inyección de Esteroides el paciente se encuentra boca abajo con una suave almohadilla en el marco del estómago para una mejor comodidad y para ayudar a relajar la columna vertebral. Esa posición de una columna vertebral da un fácil acceso a la cavidad epidural. A fluoroscope ayuda a encontrar las vértebras lumbares y nervioso rutas. En el sitio de la inyección de un anestésico local se utiliza en primer lugar, que adormece todos los tejidos hasta la superficie de la vértebra. Uso de fluoroscope el médico introduce una aguja delgada doblada en el espacio foraminal cerca de poner fin a los nervios. Sustancia de contraste ayuda a verificar la correcta posición de la aguja. Luego en la cavidad epidural foraminal un anestésico esteroides mezcla se introduce, lo que mitiga el dolor del nervio que termina. Después de la eliminación de la aguja de una pequeña banda de ayuda cubre el lugar de la inyección.

Transforaminal Epidural Lumbar, la Inyección de Esteroides Efectos

Posibles efectos secundarios son comparables con los efectos secundarios de una simple inyección: los pacientes pueden tener reacciones alérgicas, infección bacteriana o hemorragia, que rara vez ocurre.

Efectos esteroides secundarios: hinchazón de la cara, los brazos y las piernas, los diabéticos pueden tener su nivel de azúcar en la sangre planteadas.

Es obligatorio informar a su médico acerca del embarazo o el uso de la sangre de adelgazamiento "de medicamentos.

1 **Disclaimer:** La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.